


الحملة الوطنية
لمكافحة
فيروس كورونا
(COVID-19)




مَمْلَكَة البَحْرَيْن
KINGDOM OF BAHRAIN

الحملة الوطنية
لمكافحة
فيروس كورونا
(COVID-19)



مَمْلَكَة البَحْرَيْن
KINGDOM OF BAHRAIN

أسئلة وأجوبة حول التطعيمات



كيف تعمل التطعيمات؟

◆ تعمل التطعيمات على **تحفيز** الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة للفيروسات أو البكتيريا المسببة للأمراض المعدية، لإحداث استجابة مناعية، تساهم في **مواجهة** الميكروبات عند التعرض لها مرة أخرى.





لماذا يجب أخذ التطعيم؟

◆ تعد **التطعيمات** إحدى أهم التدخلات الوقائية التي كان لها دوراً فعالاً في **منع تفشي** الأوبئة على مر العصور وحماية البشرية من تداعياتها وآثارها حيث **تؤمن** **التطعيمات** **المناعة** لمتلقيها مما يسهم في **حماية** **المجتمع** من عبء الأمراض والوفيات الناجمة عنها، لذا فإن **الحرص** على **أخذ التطعيمات** الموصى بها يعد من أهم الطرق **لرفع** معدلات **المناعة المجتمعية** والحفاظ على صحة الأفراد من خطر انتشار الأوبئة.


مدى أمان وفعالية التطعيم؟

◆ **التطعيمات آمنة** بصورة عامة وفائدتها تفوق بعض الأعراض الجانبية المترتبة عليها. حيث يتم تصنيع التطعيمات من خلال عمل التجارب العلمية والتي **تمر بعدة مراحل** يتم خلالها التأكد من مأمونيتها في المراحل الأولى من التجارب، كما يتم أيضاً التأكد من فاعليتها لدى متلقي **التطعيم لحمايته من الإصابة** بعدوى المرض المستهدف بها.



هل هناك تسرع^٣ في تصنيع التطعيمات؟

◆ إطلاقاً، ولكن بفضل التعاون الدولي تم نشر
الموروث الجيني للفيروس في شهر يناير بسبب
تقدم التكنولوجيا وتم تصنيع اللقاحات من عدة دول
وبطرق تقليدية وجديدة جمعها ضمن
الاشتراطات العلمية المتعارف عليها.



هل هناك آثار جانبيهة للتطعيم؟

◆ قد تحدث بعض الآثار الجانبية للتطعيمات قد تكون هذه الأعراض موضعية: كالألم والانتفاخ في موضع الحقن، وقد تكون أعراض عامة ومنها، الصداع، الشعور بالإعياء والحمى.



كيف تتعامل مع الأعراض الجانبية؟

◆ يتم التعامل مع الأعراض الجانبية عند حدوثها بحسب نوعها وشدتها، فالأعراض البسيطة كالآلم في موضع الحقن أو الصداع فمن الممكن استخدام مسكنات الآلم لها، أما الأعراض المتوسطة أو الشديدة فيجب أخذ المشورة الطبية ليتم تشخيصها وعلاجها.



نصائح قبل أخذ التطعيم..

◆ أن لا يعاني الشخص الراغب في أخذ التطعيم من الحمى أو الأعراض المرضية المتوسطة أو الشديدة ليتمكن من أخذ التطعيم، وأن لا تكون لديه حساسية مفرطة من إحدى مكونات التطعيم.

◆ بالنسبة للنساء في سن الإنجاب: أن لا تكون المرأة حاملاً أو تخطط للحمل أو مرضعة ويفضل أن تستخدم أي مانع للحمل لمدة 3 أشهر على الأقل بعد أخذ التطعيم.

طريقة أخذ التطعيم؟

يعطى التطعيم من خلال الحقن في عضلة الذراع ويعطى في جرعتين يفصل بينها 21 يوماً

الفئات المسموح لها بأخذ التطعيم؟

تطعيم كوفيد-19 يعطى للبالغين من عمر 18 عاماً فما فوق.


هل يمكن للمصاب مسبقًا أخذ التطعيم؟

◆ نعم يمكن للمصاب مسبقًا بالفيروس أخذ التطعيم بعد مضي 90 يوماً من الإصابة. أما العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة فيمكنهم أخذ التطعيم أياً كانت نسبة المناعة لديهم.



هل من يأخذ اللقاح معرضًا للإصابة ونقل العدوى؟

◆ تتفاوت الاستجابة المناعية بين الأشخاص، فقد لا تتكون المناعة الكافية لدى متلقي اللقاح لحمايته من الإصابة بالفيروس ولكن أخذ التطعيم قد يؤمن له الحماية من الإصابة المتوسطة إلى الشديدة بالمرض، لذا قد يصاب الشخص بفيروس كوفيد 19 وقد يكون مصدراً لنقل العدوى للآخرين إذا أصيب به



طريقة التسجيل لأخذ التطعيم؟

◆ تم تخصيص موقع لتسجيل الاشخاص **الراغبين**
بالحصول على **التطعيم المضاد** لفيروس كورونا
"كوفيد - 19" وذلك من خلال الرابط التالي:

healthalert.gov.bh

