

بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

الحاصلين على جرعتين من تطعيم

سينوفارم

يمكن للفئات التالية الحصول على الجرعة المنشطة الأولى من:

(سينوفارم) ✓ (فايزر-بيونتيك) ✓



17-12 عاماً

اختياري

بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية



● 40 عاماً فما فوق

● من هم أقل من 40 عاماً

ممن يعانون من السمنة المفرطة
أو أمراض نقص المناعة أو الأمراض
المزمنة

بعد شهر واحد

من الجرعة الثانية



39-18 عاماً

بعد 3 أشهر
من الجرعة الثانية



بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

الحاصلين على جرعتين من تطعيم

فايزر-بيوتتيك

يمكن للفئات التالية الحصول على الجرعة المنشطة الأولى من:

(فايزر-بيوتتيك) ✓



12-17 عاماً

اختياري

بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية



18 عاماً فما فوق

بعد 3 أشهر
من الجرعة الثانية



بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

الحاصلين على جرعتين من تطعيم

كوفيشيلد - استرازينيكا

يمكن للفئة التالية الحصول على الجرعة المنشطة الأولى من:

(فايزر-بيونتيك) ✓



18 عاماً فما فوق

بعد 3 أشهر
من الجرعة الثانية



بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

الحاصلين على جرعتين من تطعيم

سبوتنيك

يمكن للفئة التالية الحصول على الجرعة المنشطة الأولى من:

(سبوتنيك) ✓ (فايزر-بيونتيك) ✓



18 عاماً فما فوق

بعد 3 أشهر
من الجرعة الثانية



بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

الحاصلين على 3 جرعات
من تطعيم سينوفارم

يمكن للفئة التالية الحصول على الجرعة المنشطة الثانية من:

(سينوفارم)



(فايزر-بيونتيك)



18 عاماً فما فوق

بعد 3 أشهر



من الجرعة المنشطة الأولى
من تطعيم سينوفارم

بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين والمتعافين

المتعافين الحاصلين على جرعتي تطعيم

يمكنهم الحصول على الجرعة المنشطة الأولى من:

✓ (سينوفارم) ✓ (فايزر-بيونتيك) ✓ (سبوتنيك)



بناءً على نوع التطعيم الذي تم الحصول عليه
قبل الإصابة بالفيروس



بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصابة
ومرور الفترة الزمنية المحددة من الجرعة الثانية
أو المنشطة الأولى



يمكن الاطلاع على بروتوكول التطعيم والجرعة المنشطة من خلال
الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة

healthalert.gov.bh

